

**Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen
für landwirtschaftliches Saat- und Pflanzgut**

**SORTENBESCHREIBUNGEN
FÜR DIE
SAATENANERKENNUNG**

2025

Kartoffeln

Impressum:

Herausgeber: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Anerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut
FB 3.10
Wunstorfer Landstraße 9, 30453 Hannover
Tel.: 0511 - 3665 - 0

**Nachdruck bzw. Vervielfältigung jeglicher Art
- auch auszugsweise -
nur mit Genehmigung des Herausgebers.**

Zu beachten:

"Die Angaben zu jeder Sorte stellen lediglich einen Auszug aus der jeweiligen Sortenbeschreibung dar. In Grenz- und Zweifelsfällen ist immer die umfassende Sortenbeschreibung des Bundessortenamtes heranzuziehen."

Inhalt	Seite
Merkmalstabellen und Abbildungen	2 - 11
Sortenbeschreibungen	12 – 52

Merkmalstabelle Kartoffeln

Merkmal		Stadium	Ausprägungstufen
Pflanze	Laubstruktur	1	1 Stengeltyp
			2 Zwischentyp
			3 Blatttyp
	Wuchsform	1	3 aufrecht
			5 halbaufrecht
			7 breitwüchsig
	Anthocyanfärbung des Stängels	1	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 stark
			9 sehr stark
Blatt	Offenheit	1	1 geschlossen
			3 mittel
			5 offen
	Vorhandensein von sekundären Blattfiedern	1	3 gering
			5 mittel
			7 stark
	Grünfärbung	1	3 hell
			5 mittel
			7 dunkel
	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe der Oberseite	1	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 stark
			9 sehr stark
Fiederblatt	End- und Seitenblattfiedern: Häufigkeit von Verwachsungen	1	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 stark
			9 sehr stark
	Randwellung	1	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 stark
			9 sehr stark
	Glanz der Oberseite	1	3 matt
			5 mittel
			7 glänzend

Merkmalstabelle Kartoffeln

Merkmal		Stadium	Ausprägungstufen
Blütenstand	Anthocyanfärbung der Knospe	1	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 stark
			9 sehr stark
	Blütenhäufigkeit	2	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 stark
			9 sehr hoch
	Größe des Blütenstandes	2	3 klein
			5 mittel
			7 groß
	Anthocyanverfärbung am Stiel	2	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 stark
			9 sehr stark
	Größe der Krone	2	3 klein
			5 mittel
			7 groß
	Intensität der Anthocyanfärbung an der Innenseite der Blütenkrone	2	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 stark
			9 sehr stark
	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	2	1 fehlend / sehr gering
			2 mittel
			3 hoch
	Ausdehnung der Anthocyanfärbung an der Innenseite	2	1 fehlend / sehr gering
			3 gering
			5 mittel
			7 groß
			9 sehr groß
	Größe der weißen Blütenzipfel der gefärbten Blüte	2	3 klein
			5 mittel
			7 groß

Merkmalstabelle Kartoffeln

Merkmal		Stadium	Ausprägungstufen
Knolle	Form	4	1 rund
			2 rundoval
			3 oval
			4 langoval
			5 lang
			6 sehr lang
	Augentiefe	4	1 sehr flach
			3 flach
			5 mittel
			7 tief
			9 sehr tief
	Farbe der Schale	4	1 hellbeige
			2 gelb
			3 rot
			4 rot gescheckt
			5 blau
			6 blau gescheckt
			7 rötlich braun
	Farbe des Augengrundes	4	1 weiß
			2 gelb
			3 rot
			4 blau
	Farbe des Fleisches	4	1 weiß
			2 cremefarben
			3 hellgelb
			4 mittelgelb
			5 dunkelgelb
			6 rot
			7 rot gescheckt
			8 blau
			9 blau gescheckt

Merkmalstabelle Kartoffeln

Klassifizierung nach Reifegruppen

I.	Sehr frühe Sorten
Ia.	Speisesorten
Ib.	Wirtschaftssorten
II.	Frühe Sorten
IIa.	Speisesorten
IIb.	Wirtschaftssorten
III.	Mittelfrühe Sorten
IIIa.	Speisesorten
IIIb.	Wirtschaftssorten
IV.	Mittelspäte bis sehr späte Sorten
IVa.	Speisesorten
IVb.	Wirtschaftssorten

Klassifizierung EU-Sorten: Reifezeitpunkt

EU-Sorten	Reifezeitpunkt		1	sehr früh
			3	früh
			5	mittel
			7	spät
			9	sehr spät

Stadien der Merkmalserfassung

1	Knospenstadium
2	Blühstadium
3	Reifestadium der Knollen
4	Nach der Ernte

Laubstruktur



1
Stengeltyp




2
Zwischentyp




3
Blatttyp

Stengeltyp:	Laub offen, Stengel deutlich sichtbar	Eldena, Kuba
Zwischentyp	Laub halb offen, Stengel teilweise sichtbar	Belana, Gala
Blatttyp:	Laub geschlossen, Stengel nicht/kaum sichtbar	Lady Claire, Liliana


Wuchsform



3
aufrecht




5
halbaufrecht




7
breitwüchsig

Aufrecht:	Campina, Eldena, Festien, Transit, Red Fantasy
Halbaufrecht:	Fasan, Gloria, Hansa, Lady Rosetta, Salome, Bellinda
Breitwüchsig:	Arcula, Atica, Leyla, Augusta, Skonto, Zuzanna


Blattmerkmale



Offenheit



1
geschlossen




3
mittel




5
offen


Vorhandensein von sekundären Blattfiedern



3
gering



5
mittel



7
stark

**End- und Seitenblattfiedern:
Häufigkeit von Verwachsungen**



nicht verwachsen



verwachsen


Knollenform



1
rund



2
rundoval



3
oval



4
langoval




5
lang



6
sehr lang

Blütenstand



Intensität der Anthocyanfärbung an der Innenseite der Blütenkrone:
Ist die Intensität der Anthocyanfärbung an der Innenseite "fehlend", erscheint die Blütenkrone weiß.

Allgemeines

Blatt:

Alle Merkmalerfassungen sollten an voll entwickelten Blättern aus der Mitte der Pflanze erfolgen.

Blüte:

Alle Erfassungen der Blütenfarbe sollten an der Innenseite von frisch geöffneten Blüten erfolgen.

Anthocyanfärbung:

Die Ausdehnung der Anthocyanfärbung sollte im Verhältnis zur gesamten Fläche erfasst werden. Die Verteilung und die Intensität sollten nicht berücksichtigt werden.

Die Ausdehnung der Anthocyanfärbung der Blütenknospen sollte an voll entwickelten Knospen erfasst werden, bevor die Krone sichtbar wird.

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand										Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättledern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe	
BSA	II a	4 YOU	SAKA	2	6	4	4	4	4	2	3			3	4	5	3	5	5	1	7	2	3	2	2	5	
EU	4	7 Four 7	IJsselmeer polders BV	3	6	1	4	4	6	1	1			6	3	3	5	5	6	1	7	3	3	2	1	1	
EU	6	Abilene Russet	Interseed	2	4	4	3	5	4	1	1			1	7	7	1	7	1			4	4	2	2	2	
EHS		Ackersegen	Karsten Ellenberg	1	7	1		5	5	1	3	3	5	1	5	5	1	5	1			2	7	2	2	5	
EU	9	Adelinde	Averis	3	5	1	4	5	7	1	1			3	6	5	3	5	6	3	8	2	5	1	2	2	
BSA	I a	Adorata	NORIKA	2	6	1	3	5	5	2	1			4	5	7	3	7	5	1	8	4	3	2	2	3	
BSA	III a	Adretta	NORIKA	2	5	1	3	4	4	1	3	4	6	1	7	4	1	5	1			1	4	2	2	3	
BSA	III a	Afra	Heinhold	2	5	1	3	7	4	1	3			2	5	5	1	5	4	1	5	3	3	2	2	4	
BSA	II a	Agila	NORIKA	2	5	1	3	5	4	1	2	7	7	1	2	3	1	6	3			4	3	2	2	3	
BSA	III a	Agria	Böhm	2	4	4	3	5	5	3	7	5	4	4	7	6	3	5	1			3	3	2	2	4	
BSA	IV a	Alanis	Interseed	1	5	4	3	4	6	5	5			3	7	6	2	5	4	1	6	3	3	2	2	3	
BSA	III b	Albatros	NORIKA	2	4	1	2	5	6	1	2	5	4	1	7	7	1	5	1			2	5	2	2	3	
EU	4	Alberta	Kweekbedrijf Smeenge	2	4	4	3	6	5	3	1			5	7	6	4	7	1			4	4	2	2	3	
BSA	I a	Albertine	Böhm	1	5	1	3	5	5	1	7			4	3	4	1	6	1			3	3	2	2	4	

BSA / EHS / EU		Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA		Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand								Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe	
BSA		Alcedo	NORIKA	2	7	2	5	3	4	2	1			4	6	6	3	6	5	1	8	2	5	2	2	3	
BSA	III a	Alegria	NORIKA	2	5	2		7	4	1	5	3	5	1	5	5	1	5				3	3	2	2	4	
EU	7	Aletta	Averis	1	3	3	5	5	7	1	1			7	7	7	6	7	7	3	8	1	6	2	2	2	
EU	3	Alexandra	Böhm	3	4	1	3	4	3	1	2			1	2	3	1	5	1				4	2	2	2	5
EU	6	Alicante	Coöperatie Agrico U.A.	2	4	1	2	6	4	2	1			3	8	7	1	7	1			2	3	3	2	2	4
EU	3	Allians	EUROPLANT	2	5	1		5	4	1	4	3	4	1	5	6	1	6				4	3	2	2	2	5
EU	3	Allora	Norka	3	6	1	5	5	5	1	2			1	4	5	1	5	1	1	1	1	2	3	2	2	3
EU	4	Allure	Wever		5	3		5	5	1		4	5	6	5		2	4				1-2		1	1	1	2
EU	5	Almonda	SAKA	2	5	1	1	7	4	1	1			1	8	6	1	7	1			3	3	2	2	2	5
EU	6	Alouette	Coöperatie Agrico U.A.	2	3	6	3	5	7	5	5			5	5	5	5	6	7	1	7	3	3	3	3	3	4
EU	8	Altus	Averis	2	4	4	5		7	3	3			7	8	7	4	6	1			2	5	1	1	1	1
BSA	IV b	Arnado	Böhm	2	5	2		6	7	5	3	4	5	7	7	5	5	5	4			2	4	2	2	2	1
BSA	III a	Amanda	SAKA	2	4	1	2	5	4	1	2	7	6	1	4	3	1	5	1			3	3	2	2	2	3
EU	8	Amarock	Averis	1	4	5	4	5	6	3	1			3	8	8	1	6	1			2	5	1	2	2	2

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättledern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe	
BSA	IV a	American Rose	NORIKA	2	4	7	5	6	5	8	1			7	6	7	7	5	7	1	9	6	3	3	3	7	
EU	3	Amora	B. Schaap	1	5	1		6	7	1	4	3	5	3	6	5	2	5				2	4	2	2	4	
EU	8	Amyla	Germicopa SAS	2	4	4		5	6	2	3	2	4	5	5	5	4	6				2	6	2	2	4	
EU	1	Anais	Grocep S.I.C.A.	2	5	3	4	4	5	1	3		6	3	4		2		1			3	4	1	1	4	
EU	2	Anett	Lange	3	6	3	4	5	4	1	1			3	2	3	2	5	4	1	4	2	3	2	2	4	
BSA		Angelina	Böhm	2	5	3	2	6	5	1	3			2	7	5	3	5	6	2	6	1	3	2	2	5	
EU	2	Annabelle	ZPC	2	6	3		4	4	1	7	4	5	3	2	3	2	4				5	3	2	2	5	
BSA	III a	Annalena	Böhm	1	3	2	3	5	5	2	4			2	7	6	2	5	1			4	3	2	2	4	
BSA	I a	Annegret	Norika	2	5	1	2	7	3	2	3			3	4	6	3	5	4	1	7	3	3	2	2	5	
BSA	III a	Antonia	Berding	1	4	4	5	3	3	2	6	5	1	1	7	7	3	6	5	1	7	3	2	2	2	4	
EU	9	Antora	Averis	2	3	5	4	6	6	4	1			7	6	7	5	6	6	3	7	3	3	2	2	5	
EU	2	Anuschka	Niederöstrerr. SB	2	3	3		6	6	3	3	5	5	5	7	6	3	8	2			2	2	2	2	4	
EU	5	Arany Chipke	Royal Potato	3	5	1	5	3	5	2	1			4	7	6	1	5	4	1	5	2	4	2	2	3	
EU	4	Arcade	B. Schaap	2	5	4		5	6	2	7	4	6	5	4	4	3	5	6			4	4	2	2	4	

BSA / EHS / EU				Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten		Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand							Knolle					
EU	7	Ardeche	Coöperatie Agrico U.A.	2	5	1	2	6	6	1	1					1	8	7	1	7	1				2	5	2	2	4
	5	Arlet	VSUZ	2	5	1	3	7	5	1	1					3	3	4	1	4	3	1	3	4	3	2	2	4	3
EU	1	Aromata	KWS Potato	3	5	1	2	4	4	1	1					4	8	7	3	7	5	1	7	3	3	3	2	2	4
EU	6	Arsenal	Agrico	2	4	5	1	7	5	3	1					5	5	4	2	4	1			2	5	2	2	2	3
BSA	III b	Arthus	NORIKA	2	5	2	3	7	5	1	2					5	8	7	2	5	6	1	7	4	3	3	2	2	2
EU	6	Asterix	HZPC	2	3	6		5	6	7	7	7	4			6	8	6	5	5	6			3	4	2	2	2	3
EU	6	Astra	Danespo A/S	3	5	3	4	4	7	2	1					7	8	7	5	7	1			2	5	2	2	2	3
EU	3	Augusta	Böhm	2	7	1		6	5	1	3	4	5			3	6	4	3	4	2			2	2	2	3	4	4
BSA		Auris	Interseed	1	5	4	3	5	5	5	2					6	5	5	4	5	5	3	7	4	2	2	2	2	3
EU	3	Aurora	J. Boesjes																					1					
EU	4	Austin	Interseed	2	6	4	4	6	7	1	1					6	8	7	5	8	6	1	7	2	5	2	2	4	4
EU	9	Avamond	Averis	3	4	4	4	6	4	3	1					5	8	5	3	5	1			1	7	1	2	2	3
EU	1	Avanti	Siet Holland B. V.	3	5	1	4	5	7	1	1					5	4	3	1	4	1			2	3	2	2	4	4
EU	9	Avarna	Averis	2	4	4		6	6	3	3	3	3			4	7	6	3	5				2	6	2	2	2	2

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe	
EU	8	Avatar	Averis	1	3	6	5	8	7	3	1			5	8	7	4	7	1				2	5	2	2	3
EU	7	Aveka	Averis	2	5	2		6	5	1	3	3	5						4				1	6	2	2	3
EU	8	Aveline	Averis	2	3	3	3	7	5	3	1			6	3	3	2	4	1			1	7	2	2	2	2
EU	8	Avenger	Averis	2	3	1	3	6	5	1	1			3	8	6	1	6	4	3	7	2	4	1	2	2	2
BSA	IV a	Avenir	NORIKA	3	5	1	5	4	4	2	1			1	2	3	1	5	1			4	2	2	2	2	4
EU	8	Aventor	Averis	2	3	5	4	7	7	3	1			1	6	6	1	5	1			2	3	2	2	2	2
EU	7	Aventra	Averis	2	5	4	5		7	3	3			5	6	5	4	5	1			2	7	1	1	4	4
EU	7	Avenue	Averis	3	4	6	3	6	7	3	1			7	8	6	5	6	1			3	5	2	2	3	3
BSA	II a	Axenia	Lange	2	5	2	2	5	3	1	7			3	2	3	3	5	1			4	3	2	2	2	4
EU	9	Axion	Averis	2	4	6	3	5	6	3	1			5	8	6	4	6	6	2	7	3	4	2	2	3	3
BSA	IV a	Ayla	NORIKA	2	5	2	4	6	7	1	3			3	4	4	2	5	1			4	2	2	2	3	3
BSA	II a	Baby Lou	SAKA	2	6	1	4	5	3	1	8			1	2	2	1	4	1			3	3	2	2	4	4
EU	6	Babylon	Coöperatie Agrico U.A.	1	3	5	5	7	7	3	2			5	7	6	2	5	1			3	4	2	2	5	5
EU	3	Baccara	Nordkartoffel	3	5	1		3	5	1	6	1	6	1	1	4	1	5				3	4	2	2	4	4

BSA / EHS / EU		Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand								Knolle				
					Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes
EU	3	Balatoni Rózsa	Pannon Egyetem	2	4	6	5	3	5	7	3		5	5	4	7	6	8	2	5	3	4	3	3	3	
EU	2	Ballerina	Landbrugets Kartoffelfond	2	5	1		5	6	1	6	3	4	4	3	5	5				3	3	3	2	2	4
BSA		Baltic Blue	NORIKA	2	5	8	4	5	5	8	3			3	7	6	5	7	3	4	5	5	3	8	4	8
EU	5	Baltic Fire	NORIKA	2	4	7	3	6	7	7	2			2	3	3	6	8	1	8	3	3	3	3	3	4
BSA	III a	Baltic Red	NORIKA	1	4	6	3	6	6	7	2			5	5	5	7	6	5	1	8	3	2	5	2	5
EU		Baltic Rose	Norika																							
EHS		Bamberger Hörnchen	Förderverein Bamberger Hörnla,	2	4	6	5	5	6	5	7			2	6	6	4	3	1			6	5	4	3	4
EU	6	Barcelona	Kannegieter	2	5	5	2	6	5	1	1			7	6	5	4	6	1			4	4	2	2	3
EU	3	Basa	Royal Potato	2	6	1	4	6	5	1	1			1	4	4	1	4	1			5	2	2	2	3
BSA	II b	Bavafit	Bavaria-Saat	1	5	2	3	7	3	2	2			5	2	2	3	6	5	1	7	3	3	2	2	3
BSA	IV b	Bavatop	Bavaria-Saat	1	5	1	3	5	6	2	2			4	6	7	4	6	8	3	9	2	4	2	2	3
BSA	III b	Beethoven	SAKA	2	6	3	4	5	4	3	1			3	4	4	2	5	4	3	7	2	4	2	2	2
EU	4	Belami	Station de Recherche Nord	3	6	1	3	4	4	1	1			1	6	6	1	5	1			3	3	2	2	4
BSA	II a	Belana	Berding	2	5	2	4	4	4	1	6			4	3	3	1	4	1			3	2	2	2	4

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand									Knolle						
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häuflichkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe		
EU	4	Bellarosa	EUROPLANT			6		5	6	5	1	5	5	4		4		4	4		5			3				3
EU	4	Bellinda	EUROPLANT	2	5	6		4	5	2	3	2	5	3	7	6	2	5					3	4	2	2	5	
BSA	III a	Belmonda	SAKA	2	5	2	2	8	3	2			3	4	4	2	5	5	2	7			2	3	2	2	4	
BSA	II b	Beo	Norika	3	6	1	4	5	4	1	2			1	3	4	1	5	1				2	4	2	2	3	
BSA	I a	Berber	Friese	2	5	3		6	6	4	5	5	7	5	5	5	3	5					3	3	2	2	3	
BSA		Berist	Firibeck	1	4	3	3	5	4	1	2			4	2	3	2	5	1				4	3	2	2	4	
EU	3	Bernadette	Lange	1	3	2		5	5	4	5	3	5	6	4	5	5	4					3	3	2	2	3	
EU	5	Bernina	Berding	1	4	1	3	5	4	1	3			1	7	6	1	7	1				4	4	2	2	5	
BSA	III a	Bettina	Bavaria-Saat	2	4	3	3	6	5	1	1	5	5	5	5	4	3	5	1				3	3	2	2	3	
BSA	III a	Bigrossa	Bay. Pflanzenzuchtgesellschaft	1	4	6	4	4	4	5	7	5	6	2	6	6	7	6	2	1	3		4	2	3	3	4	
EU		Bintje	NAK																									
	2	Biogold	Van Rijn	3	6	1		4	5	1	3	1	6	1	1	3	1	4					3	4	2	2	3	
BSA	III a	Birgit	Firibeck	2	6	4	1	7	3	3	1	4	5	3	7	6	4	5	3	1	6		3	2	3	3	5	
BSA	II a	Birte	NORIKA	2	5	1	5	5	4	1	3	6	6	1	2	3	1	5	1				2	3	2	2	5	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand								Knolle					
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
BSA	IV a	Blaue Anneliese	Karsten Ellenberg	1	6	7	4	8	6	9	1			2	7	9	3	8	1			3	3	5	4	8
EU	5	Blaue St. Galler	St. Gallische	2	5	9		3	7	9	4	4	4	8	4	7	8	7				5	4	5	4	
EU	4	Blazer Russet	Interseed	2	5	6	4	7	7	3	1			8	8	7	5	8	1			4	4	2	1	1
EU	8	BMC	Averis	1	3	5	4	8	7	3	1			6	9	7	5	6	1			1	5	2	1	2
EU	5	Bohemia	Vesa Velhartice	3	5	1	5	3	3	1	3			1	3	4	1	5	1			3	3	2	2	4
EU	8	Bonza	Firbeck	2	6	2		5	4	4	3	5	5	3	7	5	2	5				2	3	2	2	4
BSA	I a	Borwina	NORIKA	2	6	2		6	5	3	3	3	7	3	4	4	2	5	3			2	3	2	2	4
EU	6	Boryna	Hodowla Ziemiaka	2	3	7	3	4	5	5	4			5	6	6	6	7	6	3	7	1	6	3	3	1
BSA	III b	Boss	Firbeck	2	5	1	3	4	5	1	3			1	4	6	1	6	1			3	3	2	2	4
EU	1	Botond	Pannon Egyetem	1	6	6	4	4	5	7	1			2	1	3	5	5	5	1	7	2	5	3	3	1
EU	5	Brooke	Pepsico																				2			
EU	1	Bropanna	Bavaria-Saat	2	5	2	5	5	5	1	1			3	3	3	3	5	5	1	8	3	3	2	2	3
BSA	III a	Calisto	Böhm	1	3	2	3	7	5	1	2			5	7	7	3	5	6	1	8	4	3	2	2	2
EU	4	Camelia	HZPC	2	4	1	2	5	4	1	1			1	6	5	1	6	1			3	3	2	2	4

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand										Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe		
EU	1	Capri	Bavaria-Saat	2	5	3	4	5	6	1	4			1	1	4	1	7	1	1	1	3	3	2	2	4		
EU	5	Captiva	Böhm	3	5	1	2	5	3	1	1			3	3	3	1	5	1	7	5	3	2	2	4			
EU		Capucine	Germicopa SAS																									
EU		Cara	Teagasc Oak Park																									
BSA	III b	Carlos	SAKA	1	4	1	3	7	6	1	3			1	8	8	2	6	1		2	4	2	2	2			
EU	6	Carolus	Coöperatie Agrico U.A.	1	3	6	3	5	6	3	1			7	7	5	5	6	1	8	3	4	2	3	4			
EU	3	Carrera	HZPC	2	2	3	5	4	6	2	4	4	6	6	5	5	3	5	4		3	3	1	1	4			
BSA	III b	Caruso	SAKA	2	6	1		6	5	1	5	4	4	1	7	6	1	5			2	3	2	2	4			
BSA	IV a	Cascada	NORIKA	2	6	1	3	3	3	1	1	3	5	2	7	7	1	7	1		3	3	2	2	5			
EU	2	Catania	Böhm	3	6	1	2	6	6	1	1			7	3	4	2	5	1		4	3	2	2	2			
EU	5	Challenger	HZPC	2	5	2	4	6	6	1	2			1	6	5	1	6	1		4	3	2	2	3			
	3	Charlotte	Wachtendorf	2	5	4		7	5	4	2	3	4	4	6	6	3	6	3		4	3	2	2	5			
BSA	III a	Chenoa	Interseed	1	6	1	3	5	6	4	4			1	5	7	1	8	1		5	3	2	2	3			
EU		Christel	Lange	3	6	2	4	4	5	1	1			5	5	4	3	4	1		2	4	2	2	5			

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt		Blütenstand							Knolle							
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
BSA	II a	Cilena	Nordkartoffel	2	4	1		5	6	2	3	2	5	1	4	5	1	6				5	3	2	2	4
EU	7	Clearwater Russet	Interseed	3	3	2	4	4	4	1	1			5	6	5	2	6	5	1	1	4	3	3	1	1
BSA		Coco	SAKA	2	5	1	2	4	4	1	3			1	6	5	1	6	1			3	3	2	2	4
BSA	I a	Colette	Böhm	2	6	2	3	6	5	1	2	5	6	5	5	6	2	6	6	2	8	4	2	2	2	3
EU	1	Colomba	Pias	3	6	4	3	6	5	1	1			7	6	5	3	5	1		2	4	2	2	4	
BSA	III a	Columbia	Böhm	1	4	3	4	5	4	3	4			4	7	5	2	5	1		2	3	2	2	4	
BSA	III a	Concordia	Böhm	2	7	2	5	4	3	2	2	5	5	3	3	4	2	5	1		3	2	2	2	4	
EU	7	Connect	IJsselmeer polders BV	2	4	1	3	4	5	1	1				1		1				2	3	2	2	4	
BSA		Cordula	Böhm	1	5	3	3	5	4	2	2			7	7	8	8	6	6	1	7	2	3	2	4	
BSA	I a	Corinna	Böhm	1	3	3	3	5	5	1	2			3	2	3	3	4	1		3	2	2	2	4	
EU		Coronada	Böhm	3	5	1	4	4	4	1	4			5	3	5	1	4	1		4	3	2	2	4	
	6	Crisps4all	HZPC	2	6	3	3	6	4	1	1			5	8	7	3	7	1		3	4	2	2	3	
BSA		Curtis	Interseed	1	5	1	3	5	5	1	3			4	6	7	2	6	1		3	4	2	2	3	
EU	4	Dali	Ropla ZPC	1	4	3		5	5	2	4	3	5	5	4	3	3	5			3	3	2	2	4	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe	
BSA	III a	Damaris	Lange	2	6	1	2	3	4	1	4			3	4	4	2	4	1				3	3	1	1	3
BSA	III a	Danina	Böhm	1	5	3	3	5	5	2	4			4	3	5	2	3	1				3	3	2	2	4
EU	5	Darling	Danespo A/S	2	4	2	2	8	5	2	1			4	6	5	2	5	1				4	3	2	2	4
EU	9	Dartiest	Semagri Holland	1	3	6	5	5	7	4	1			7	8	7	6	7	1				2	5	2	2	2
	5	Delphine	Lange	1	4	8		6	6	9	5	3	5	5	4	6	6	5	6				3	3	3	3	3
EU		Désirée	Lange	1	4	6	3	4	6	6	3	4	5	5	7	7	8	6	5	1	5		3	4	3	3	3
EU		Diamant	Freek Brands																								
EU	9	Dirigent	Darwinkel	1	3	4	3	6	5	1	1			5	8	7	3	8	1				1	5	2	2	5
BSA	III a	Ditta	Böhm	1	4	1		6	5	2	6	3	4	2	4	4	1	5					4	3	2	2	4
BSA	II b	Django	Bavaria-Saat	1	4	2	3	5	5	2	3	4	5	2	5	4	1	6	1				3	5	2	2	1
EU	3	Donald	Averis	2	4	3		7	5	1	3	3	5	3	5	5	3	5				2	4	2	2	3	3
EU	3	Donata	Böhm	1	4	1	4	6	7	1	1			1	8	6	1	6	1				4	3	2	2	3
BSA	III a	Dorett	Bavaria-Saat	1	3	3	2	6	5	2	3			7	5	7	4	5	1				2	4	2	2	5
EU	9	Ebexa	Averis	1	3	3	3	6	7	2	1			1	8	7	1	7	2	2	2		1	7	2	2	3

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand							Knolle						
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
EU		Edison	SAKA	3	5	3	2	5	5	3	1			7	8	6	3	7	7	2	7	4	4	2	2	3
EU		Edony	Germicopa SAS																							
EU	1	Eersteling	Brammer			3			7		5	1			3			1				4	1	2		3
EU	4	El Mundo	Van Rijn	3	4	7	3	4	5	2	1			8	8	7	8	6	8	1	7	3	3	2	2	3
EU	7	Elaia	Germicopa SAS	2	4	1	2	8	6	1	1			4	8	7	1	7	1			1	7	2	2	1
BSA	III b	Eidena	Böhm	1	3	2		6	6	1	2			1	3	3	1	4	5	1	6	3	4	2	2	3
BSA	II a	Elfe	Nordkartoffel	2	5	1		5	5	2	5	5	6	1	4	5	1	6				2	3	2	2	4
BSA	III a	Elise	Böhm	2	5	1	3	5	3	2	2			5	6	5	3	5	5	1	6	3	3	2	2	4
EU	4	Emanuelle	HZPC	3	6	2	2	6	5	1	1			3	4	4	1	5	1			4	2	2	2	5
BSA	III a	Emiliana	Böhm	1	3	2	4	3	5	1	9			7	6	4	3	4	1			3	3	2	2	5
EU	4	Endeavour	Jisselmeerpolders BV	2	5	4	3	6	6	3	1			4	7	6	3	6	1			2	4	2	2	4
	6	Energie	Wildeboer	2	4	4	3	5	6	3	1			5	6	6	4	5	1			2	6	2	2	4
EU	9	Eris	Station de Recherche Nord	1	6	2	4	5	5	2	2			3	7	8	2	7	3	1	7	1	6	2	2	2
EHS		Erna	Martin Huber																							

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittellrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe	
BSA	IV a	Etana	Böhm	2	5	2	3	6	4	1	3			3	7	7	3	6	6	1	7	4	2	2	2	3	
BSA	III b	Eurodelta	Böhm	2	5	4	3	6	6	2	1			1	4	5	1	6	7	1	7	2	5	2	2	2	
BSA	III b	Eurofit	EUROPLANT	2	5	2	2	8	5	4	1			3	7	6	2	6	5	2	8	2	5	2	2	3	
EU	8	Euroflora	Böhm	2	4	4	4	5	7	3	1			5	8	6	5	7	8	1	8	3	6	2	2	4	
EU	9	Eurogrande	Böhm	2	4	6	2	8	7	3	1			6	7	6	5	6	1			1	6	2	2	2	
BSA	IV b	Euomira	EUROPLANT	2	5	3	4	6	6	2	2			3	3	5	1	4	1			1	6	2	2	1	
		Europrima	Böhm	2	4	1	3	7	6	1	2	6	5	1	4	3	1	3	1			2	5	2	2	3	
BSA	IV b	Europura	Böhm	2	4	4	4	6	7	3	2			4	6	6	3	4	6	3	8	2	4	2	2	2	
BSA	IV b	Euroresa	Böhm	2	6	1	2	5	4	1	1			2	8	6	3	8	1			2	6	2	2	3	
EU	6	Eurostar	Van Rijn	1	4	5	3	7	5	3	5			6	7	6	3	5	1			4	4	2	2	3	
BSA	IV b	Eurostarch	Böhm	1	3	1	3	6	5	1	5	6	5	4	7	7	2	7	1			2	4	2	2	1	
BSA	III b	Euroterra	EUROPLANT	2	5	2	4	6	5	1	1			1	6	5	1	5	1			1	6	2	2	2	
		Eurotina	Böhm	1	6	4	3	5	5	4	1			3	7	7	3	6	1			1	5	2	2	2	
EU	9	Eurotonda	Böhm	2	5	3	3	6	7	1	1			5	7	6	2	7	1			2	5	1	1	2	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand							Knolle							
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe	
EU	9	Euroviva	Böhm	3	4	3	3	7	5	1	1	1			1	6	5	1	6	1			1	5	1	2	3
EU	4	Everest	Van Rijn	2	6	3	4		7	1	3			3	8	7	2	7				3	4	1	1	3	
BSA	III a	Exquisa	Firibeck	2	5	1		6	5	1	4	3	5	1	7	5	1	5				5	3	2	2	4	
EU	5	Fabiola	Niederöster- r. SB	2	5	7		6	5	7	3	5	7	5	8	5	7	5	6			3	2	3	3	4	
BSA	II a	Fabricia	Böhm	2	5	2	5	3	3	1	5			5	4	5	1	6	1			2	3	2	2	4	
EU	7	Falcon	Danespo A/S	3	6	1	4	5	4	2	1			5	8	6	3	6	3	1	4	2	6	2	2	4	
EU	7	Falcon	Danespo A/S	3	6	1	4	5	4	2	1			5	8	6	3	6	3	1	4	2	6	2	2	4	
BSA	IV a	Fasan	NORIKA	2	5	2	3	6	5	2	2	6	6	5	7	7	2	6	1			2	4	2	2	3	
BSA	III b	Favola	Böhm	2	5	2	3	6	4	2	2			1	7	7	1	5	1			3	4	2	2	3	
BSA	IV b	Festien	Feunekes	1	3	2	2	7	4	1	3			1	7	8	1	5	1			1	7	2	2	1	
BSA	I a	Filipa	Böhm	1	3	3	3	6	3	2	3			3	7	7	3	7	1			4	3	2	2	2	
BSA	I a	Finka	Böhm	2	5	1		7	5	1	3	4	5	4	3	4	2	6				2	3	2	2	4	
BSA	III a	Fiona	NORIKA	2	5	2	2	6	5	1	2			3	2	3	1	4	1			3	3	2	2	5	
BSA	II a	Florentina	Böhm	1	4	2	2	5	4	2	4			3	4	4	1	5	1			3	4	2	2	3	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand										Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe		
BSA	III a	Floridana	Böhm	1	6	2	3	7	4	1	4			3	5	5	2	6	1			2	3	2	2	3		
EU	7	Folva	Plantenyhedsna evnet	1	5	3		6	5	1	4	1	4	7	6	5	3	4	7			2	3	2	2	3		
EU	5	Fontane	Svalöf Weibull BV	2	5	4		6	6	2	3	6	6	3	5	5	3	5				3	4	2	2	4		
EU	3	Forza	Ijsselmeer polders BV	3	5	2	4	6	5	1	1			5	3	4	3	5	1			4	3	2	2	5		
BSA	II a	Franca	Böhm	2	6	1	2	8	4	1	4			2	3	4	2	5	1			2	2	2	2	4		
BSA	II a	Francis	Interseed	1	3	4	2	7	5	1	3			4	4	5	3	5	1			4	2	2	1	2		
EU	6	Furia	Germicopa SAS	3	6	1	2	6	8	1	1			3	5	5	2	5	1			1	5	2	2	3		
BSA	II a	Gala	NORIKA	2	5	1		6	5	1	4	4	6	3	3	5	1	5				2	3	2	2	5		
EU	6	Gaya	Ijsselmeer polders BV	3	4	3	3	5	4	1	1			3	6	6	2	5	1			3	5	2	2	4		
EU	8	Georgina	Böhm	3	4	1	5	7	4	1	1			1	5	5	1	5	1			3	4	2	2	4		
BSA	I a	Geraldine	Böhm	2	4	1	3	4	4	2	3			5	5	4	2	4	1			2	2	2	2	4		
EU	7	Gerona	B. Schaap	3	4	1	3	6	6	1	1			4	5	5	2	6	1			2	3	2	2	5		
EU	1	Glorietta	Böhm	3	6	5	2	6	6	1	2			7	3	5	5	5	1			4	3	2	2	5		
BSA	III b	Godzilla	Firbeck	2	5	1	3	5	4	1	2			2	7	7	2	6	6	1	8	2	7	2	2	3		

BSA / EHS / EU		Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten		Sorte		Antragssteller laut BSA		Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand								Knolle			
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufikeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe		
EU	7	Golden River	Royal Potato	2	4	1	2	5	5	1	1			1	5	5	1	6	1				3	3	2	2	3	
BSA	II a	Goldmarie	Norika	1	3	1	5	3	6	2	5			2	6	4	1	6	1				4	2	2	2	4	
EU	1	Gourmetessa	Firbeck	3	6	2	3	5	4	1	3			4	3	3	2	5	1				5	3	2	2	5	
EU	5	Granada	SAKA	3	4	1	3	8	5	1	1			1	4	4	1	6	1				5	3	2	2	3	
BSA	IV a	Granola	SAKA	2	4	2	4	7	5	2	3	5	4	4	6	5	1	5	4	1	8	2	2	4	2	2	4	
BSA	II a	Gunda	Böhm	2	4	3	2	7	5	1	5			5	7	6	4	6	6	2	7	3	4	2	2	2	3	
EU	3	Gwenne	Germicopa SAS	2	5	1	3	6	4	1	5			1	4	6	1	6	1				5	3	2	2	4	
EU	6	Hannibal	Station de Recherche Nord	2	5	1	1	8	4	1	7			3	5	6	1	5	1				1	5	2	2	1	
EU		Hansa	Ebstorf-Rosche eG	2	5	1		6	5	2	3	3	4	5	7	5	2	5				3	4	2	2	2	3	
BSA	IV b	Harrier	NORIKA	2	6	1	4	5	5	1	3			4	5	4	3	6	1				2	4	2	2	4	
EU	5	Harry	Cullen Allen Ltd	2	5	3	3	6	5	1	1			4	5	4	4	6	4	1	7	2	2	1	1	1	3	
BSA	III a	Heidemarie	Karsten Ellenberg	2	5	1	3	3	5	1	1				1								3	4	2	2	4	
		Heideniere	Karsten Ellenberg	2	4	1	2	5	4	1	2			1	5	5	1	4	1				6	2	2	2	4	
BSA	IV a	Heiderot	Karsten Ellenberg	2	6	5	3	7	5	7	2			2	6	7	6	5	1				4	3	3	3	6	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häuflichkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe	
EU	6	Helios	SAKA	2	3	1	3	6	4	1	1			6	6	5	2	4	1				2	5	2	2	3
EU	5	Herbstgold	Niederösterr. SB	2	3	5	2	7	6	3	5			9	6	4	7	5	1				3	5	2	2	4
EU	9	Hermans	Averis	3	4	4	2	7	7	2	1			5	5	5	5	6	3	7			1	4	1	1	2
EU	5	Hermes	Niederösterr. SB	2	5	1		7	3	1	3	5	5	3	3	4	3	6	4				2	5	2	2	4
EU	5	Honorata	Böhm	2	5	3	3	6	6	1	3			6	7	6	5	6	1	1			2	5	1	1	3
BSA	e	Horizon	Higgins	1	5	1	5																				
		Huckleberry Gold	Norika	2	5	6	4	6	6	7	4			4	8	7	6	7	7	2	9		2	4	5	4	4
BSA	IV b	Hydra	NORIKA	1	4	3	4	7	4	2	1			1	5	5	1	4	1				2	6	2	2	2
BSA	III a	Ikarus	NORIKA	1	4	3	3	5	7	1	3			3	7	6	2	6	1				4	3	2	2	4
BSA		Ina	Böhm	1	5	4	4	5	6	2	2			6	8	6	6	6	7	1	8		2	4	2	2	4
BSA		Ina	Böhm	1	5	4	4	5	6	2	2			6	8	6	6	6	7	1	8		2	4	2	2	4
EU	3	Innovator	HZPC	2	4	1		4	4	1	5	5	5	1	7	7	1	7					4	3	2	2	3
EU	1	Isabella	Böhm	2	5	1	4	4	5	1	4			6	3	4	2	5	1				2	3	2	2	5
BSA	III b	Islara	Böhm	2	6	1	2	4	5	1	3			2	5	6	1	6	1				2	5	2	2	2

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt		Blütenstand								Knolle						
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
BSA	II a	Ivetta	Böhm	2	5	3	3	5	3	2	2			4	2	3	2	3	6	1	8	3	3	2	2	4
EU	3	Ivory Russet	HZPC	3	5	4	3	5	7	1	2			4	5	5	3	5	7	1	7	5	3	2	2	1
EU	6	Janke	Kannegieter	1	3	4	2	7	7	1	1			6	8	7	3	6	1			4	3	2	2	4
EU	8	Jasia	Niehoff	2	4	3		5	6	1	2	4	4	2	8	7	3	7				2	4	2	2	3
BSA	IV a	Jelly	Böhm	2	5	3	3	6	5	2	2			5	5	5	4	5	1			3	3	2	2	4
BSA		Jola	NORIKA	2	6	1	4	3	4	1	2			1	2	2	1	3	1			3	2	2	2	5
BSA	IV b	Jonas	SAKA	2	5	1	3	6	4	1	2			2	5	5	1	6	1			2	4	2	2	1
BSA		Joris	Interseed	1	3	2	2	6	5	1	3			2	6	7	1	7	1			2	4	2	2	3
EU	6	Jubilat	SAKA	2	5	2	4	5	7	3	3			1	7	7	1	5	1	1	1	3	5	1	1	1
BSA	III a	Jule	SAKA	2	5	1	2	5	5	1	3			4	4	6	3	6	1			3	3	2	2	4
EU	3	Julinka	Sativa Kerkov	2	5	3	4	6	5	2	3			1	3	6	1	3	1	1	1	3	3	2	2	4
BSA	III b	Jumbo	Bay. Pflanzenzüchtung es.	2	4	4		6	6	3	3	6	5	4	7	6	3	7				2	3	2	2	2
EU	6	Jurata	Böhm	3	5	1	3	7	5	1	3			5	5	5	6	5	3	1	1	3	3	2	2	2
BSA	I a	Jutta	Bavaria-Saat	2	5	1	3	6	4	1	3			5	3	3	2	5	1			3	3	2	2	4

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand								Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättledern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
BSA	III a	Juventa	Böhm	2	4	4	3	5	5	3	3			5	5	6	4	5	7	1	8	3	3	2	2	4
BSA	III a	Juventa	Böhm	2	4	4	3	5	5	3	3			5	5	6	4	5	7	1	8	3	3	2	2	4
BSA	I a	Juwel	Bavaria-Saat	1	6	2	3	7	5	1	2	5	5	5	5	5	3	5	4	1	7	3	3	2	2	4
EU		Kardal	KARNA		5	2		8	7	1		3	7	1	5		1	5				1		2	2	1
BSA	III a	Karelia	Böhm	1	5	2	3	4	3	1	4			2	7	6	3	6	4	1	6	2	4	2	2	4
BSA	II a	Karlana	NORIKA	2	6	2	3	6	5	1	3	6	6	2	6	5	1	6	4	1	7	2	4	2	2	3
EU	6	Kaszub	Hodowla Ziemiaka	3	5	2	3	3	6	3	3			7	7	7	6	8	7	3	7	1	3	2	2	2
BSA		Kerren	Böhm	2	5	3	2	6	3	2	4			6	7	7	4	7	1			4	4	2	2	1
BSA	II b	Kiebitz	NORIKA	1	4	1	4	3	4	1	4			2	5	5	1	6	3	1	7	2	4	2	2	4
BSA	III b	Kilian	Bavaria-Saat	1	4	4	3	6	5	4	5			3	6	7	2	6	1			2	3	2	2	4
BSA		Kimi	NORIKA	2	5	1	3	6	7	1	2			1	5	5	1	5	1			2	4	2	2	3
EU	5	King Russet	IJsselmeer polders BV	2	4	3	3	5	7	2	1			4	8	7	3	6	6	2	7	4	4	2	1	1
EU	4	KIS Slavnik	Kmetijski institut Slovenije	2	6	1	5	7	4	1	5				1							3	3	2	2	3
BSA	III a	Krone	Bavaria-Saat	2	5	1		5	5	3	4	4	6	6	6	4	3	6				3	3	2	2	4

BSA / EHS / EU		Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt		Blütenstand							Knolle						
					Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufikeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes
BSA	III b	Kuba	Niehoff	1	5	1		6	6	1	6	5	6	4	6	5	1	6				2	4	2	2	3
BSA	IV b	Kuras	Böhm	2	6	2		5	6	2	3	5	6	6	6	6	2	6				2	4	2	2	2
EU	3	La Vie	HZPC	3	6	1	4	5	4	1	1			3	4	4	1	4	1			4	3	2	2	5
	4	Labadia	Van Rijn	2	4	2		7	4	1	3	3	4	5	6	6	2	6				3	4	2	2	3
EU	3	Labella	IJsselmeer polders BV	3	5	7	3	6	5	6	1			7	4	5	6	4	8	1	7	4	4	3	3	4
EU	5	Lady Alicia	Meijer	3	7	1	2	7	4	1	1			1	7	7	1	7	1			2	5	1	2	4
EU	3	Lady Amarilla	Meijer	3	6	3	4	6	4	2	1			3	1	6	1	5	1			4	3	2	2	5
EU	5	Lady Anna	Meijer	2	5	4	3	6	6	2	1			6	6	5	5	5	1			5	3	2	2	4
EU	2	Lady Britta	C. Meijer B.V.	3	5	3	5	6	6	1	1			7	7	6	4	6	1			2	4	2	2	4
EU		Lady Christl	Meijer		6	2		7	5	1		3	5	5	1	3	1	3	5			3		2	2	3
EU	2	Lady Claire	Meijer	3	5	2		6	4	2	4	4	4	2	3	3	1	5				3	4	2	2	3
EU	7	Lady Forte	Meijer	3	6	5	3	8	4	3	1			6	6	5	2	5	1			4	3	2	2	3
EU	6	Lady Jane	C. Meijer B.V.	2	4	3	2	5	6	2	1			2	8	8	1	7	7	1	8	4	3	2	2	5
BSA	III b	Lady Rosetta	Strahmann	2	5	5		7	4	5	4	6	4	5	6	6	6	5				1	4	3	3	3

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häuflichkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe	
EU	5	Lanorma	T. Krijthe, PEIZE	2	5	3	6		5	3	4			4	5	5	3	5				3	3	1	1	3	
EU	2	Laperla	Ijsselmeer polders BV	3	7	4	2	7	6	2	7			7	6	6	6	6	1	7		2	3	2	2	3	
EU	4	Larissa	EUROPLANT	2	5	1	3	5	4	1	1			7	6	5	3	5	1			3	3	2	2	5	
BSA	III a	Laura	Böhm	2	4	4	3	4	4	4	5	4	6	2	5	5	3	5	3	1	2	3	2	3	3	5	
BSA	I a	Lea	SAKA	1	6	3	2	9	6	3	2			4	4	6	2	7	1			3	3	2	2	5	
EU	5	Leonata KWS	Stet Holland B. V.	1	3	1	3	4	5	1	1			1	7	7	1	8	1			4	3	2	2	2	
EU	2	Leoni	Ijsselmeer polders BV	3	6	3	3		6	1	4			4	3	6	3	6	5			3	4	1	1	4	
EU	6	Levante	Coöperatie Agrico U.A.	3	5	1	4	7	4	1	1			1	6	5	1	5	1			4	2	2	2	4	
EU	3	Levinata KWS	Stet Holland B. V.	3	6	4	5	5	5	3	1			7	8	7	3	7	1			2	4	2	2	4	
BSA	I a	Leyla	Nordkartoffel	2	7	1	4	5	4	1	3	5	7	2	3	4	1	5	3	1	5	3	3	2	2	4	
EU	1	Liliana	Sativa Kerkov	3	5	3	3	4	4	4				1	1							2	3	2	2	4	
BSA	III a	Lilly	SAKA	2	5	3	2	6	4	1	1			3	7	6	3	7	1			3	3	2	2	4	
BSA	III a	Linda	Karsten Ellenberg	2	5	1	4	7	6	1	2			3	5	4	1	5	1			4	4	2	2	4	
BSA	IV a	Linus	Norika	1	5	1	3	5	4	1	5			1	7	6	1	6	1			4	3	2	2	3	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand								Knolle					
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
BSA	I a	Liora	NORIKA	1	6	1	4	7	4	1	1			1	6	7	1	7	1			3	3	2	2	5
BSA	II a	Lisana	Bavaria-Saat	1	4	1	3	5	5	5	1	3		3	5	6	2	6	1			3	4	2	2	4
BSA	III a	Loreen	NORIKA	2	6	1	2	7	4	1	2			1	6	7	1	5	1			3	4	2	2	4
EU	4	Loreley	Coöperatie Agrico U.A.	2	5	1	3	5	5	5	1	8		5	3	3	2	4	1			4	2	2	2	5
BSA	III a	Lotta	NORIKA	1	3	4	3	5	5	5	2	2		3	6	7	3	6	5	1	6	3	3	2	2	4
		Lubeca	Norika	1	5	5	2	6	5	7	2			2	6	7	5	6	4	1	6	4	3	3	2	4
	6	Lucilla	Böhm	3	4	1	3	5	4	1	1			3	6	5	1	7	1			2	4	2	2	4
BSA	II a	Ludmilla	SAKA	1	4	1	3	5	6	1	6	6	5	1	5	6	1	6	1			5	3	2	2	3
BSA	III b	Lukas	SAKA	2	5	2	3	6	7	1	1			1	5	5	2	5	1			2	5	2	2	2
EU	7	Lunarossa	Kweekbedrijf Smeenge	2	4	5	2	7	6	6	1			3	5	5	4	6	4	1	4	3	3	3	3	4
EU	8	Luneba	Germicopa SAS	2	3	1	4	5	5	5	1	1		3	7	6	1	6	1			2	6	1	2	3
BSA	III a	Macarena	Niehoff	1	4	6	2	5	5	7	7			2	4	5	9	5	6	6	1	4	3	3	2	4
EU	4	Madeira	Dr. R.J. Mansholt	3	5	1	4	3	5	1	2			1	5	4	1	6	1			3	4	2	2	4
EU	4	Madeleine	Dr. R.J. Mansholt	2	5	1		5	3	1	3	6	3	2	4	5	2	5				3	4	2	2	4

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle					
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittellrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe		
EU	2	Madison	Dr. RJ Mansholt	3	6	1	3	5	6	1	1			8	7	6	3	7	7	1	9	1	5	2	2	2	2	2
BSA	II a	Madita	Forka	2	5	2	3	7	5	1	2			1	3	4	1	5	1			3	3	2	2	4	4	4
EU	8	Madrid	Kannegieter	1	5	2	2	7	6	3	1			3	7	6	1	6	1			2	5	2	2	4	4	4
EU	1	Magda	VESA	3	6	1		7	4	1	3	4	5	1	3	4	1	5				2	3	2	2	4	4	4
	5	Malika	Mansholt	3	5	1	3	5	5	1	1			1	7	5	1	5	1			3	3	2	2	5	5	5
EU	3	Malvina	VSUZ	3	5	3	3	5	6	1	1			1	3	4	1	4	1	1	1	4	2	2	2	3	3	3
BSA	IV/b	Mammut	Bavaria-Saat	1	4	2	2	8	6	3	2			5	7	7	3	5	5	1	8	3	5	2	2	3	3	3
BSA	II a	Marabel	Böhm	2	5	2		6	5	2	4	5	5	1	5	4	1	6				3	3	2	2	4	4	4
BSA		Marabou	NORIKA	1	4	1	2	8	3	1	2			1	6	5	1	4	1			3	3	2	2	2	2	2
EU	4	Marilyn	HZPC	3	6	1		6	6	1	3	1	4	3	5	4	2	4	4			5	4	2	2	3	3	3
BSA	III a	Mariola	Böhm	1	4	2	2	6	5	1	2			4	3	4	2	6	1			3	2	2	2	4	4	4
BSA	II a	Marion	Böhm	1	5	3	3	6	6	3	2			5	5	6	3	4	1			3	3	2	1	2	2	2
EU	4	Mariska	Mansholt	2	5	4	4	5	3	2	1			4	4	3	3	4	1			3	3	2	2	5	5	5
EU	7	Markies	Weuthen	1	3	5		7	5	3	3	4	4	3	7	5	4	5				3	4	2	2	3	3	3

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt		Blütenstand								Knolle						
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
BSA	III a	Marie	Böhm	1	4	3	3	7	3	3	1			4	7	6	4	6	1			3	3	2	2	5
BSA	III a	Mary Ann	NORIKA	1	5	3	4	4	4	3	4			2	6	7	3	6	1			3	2	2	2	5
EU	2	Marylou	Bunk	3	5	1	4	6	5	1	1			3	6	5	1	5	4	1	5	4	3	2	2	5
BSA	I a	Mascha	Lange	1	3	4	4	6	4	2	7			2	4	4	2	4	3	1	6	3	2	2	2	4
BSA	IV b	Maxi	Bay. Pflanzenzucht es.	2	5	1	3	4	5	1	2	5	5	1	7	6	1	6	1			2	4	2	2	3
BSA	IV b	Maxilla	NORIKA	2	5	1		6	4	1	3	4	4	4	5	4	2	5				2	4	2	2	4
EU	1	Maya	Danespo A/S	3	6	1	4	4	4	1	3			1	2	3	1	4	1			2	3	2	2	4
EU	5	Meera	Plantera B.V.	2	6	3	4	5	4	1	1			6	7	6	2	5	5	1	7	1	4	2	2	4
EU	5	Megan	VSUZ	3	5	1	3	4	4	1	3			2	5	4	1	5	3	2	3	3	3	2	2	4
EU	5	Meireska	Niederöstr. SB	1	3	7	5	7	7	9	2			3	6	7	5	4	7	1	8	3	4	3	3	3
BSA	III a	Meister	Fritbeck	1	6	3	3	6	6	1	8			3	5	6	2	5	1			4	4	2	2	1
BSA	III a	Melanie	Böhm	1	3	3	3	6	3	2	3			3	7	7	3	7	1			4	3	2	2	2
BSA		Melia	Forka	2	5	4	3	7	5	2	3			5	7	7	4	6	4	1	7	3	2	2	2	4
BSA	I a	Melissa	Böhm	2	6	1	3	5	3	1	2			1	4	4	1	5	1			2	2	2	2	4

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand										Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattdornen	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe		
EU	6	Melody	Meijer	2	5	3		6	4	1	3	3	5	5	4	4	2	5	4			3	3	2	2	4	4	
BSA	III a	Merle	SAKA	2	6	2	3	5	4	1	4			2	4	5	2	5	5	1	5	3	3	2	2	5	5	
BSA	II a	Mia	Norika	2	7	2	3	6	4	1	3			3	2	2	2	4	1			2	3	2	2	5	5	
EU	1	Mikado	Danespo A/S	3	6	1	2	5	4	1	2			3	3	3	2	4	1			2	3	2	2	4	4	
BSA		Milenia	Böhm	2	6	2	2	6	5	1	4			5	3	3	5	4	1			4	2	2	2	4	4	
EU		Milva	Berding		6	1		5	5	1		4	6	3	5	3	2	5						2	2	4	4	
EU	4	Miranda	SAKA		3	1			5			1		1	5							3	3	2	2	4	4	
BSA	II b	Moa	NORIKA	2	5	1	5	3	5	1	2			3	4	4	3	4	1			3	4	2	2	3	3	
BSA	IV b	Mogli	Bay. Pflanzenzüchtgesellschaft	1	3	1	4	4	6	1	1			1	9	7	1	5	1			2	4	2	2	2	2	
EU	2	Monika	VESA	2	3	1		7	5	1	5	4	6	7	4	4	4	6	6			4	3	2	2	3	3	
EU	3	Monique	Böhm	3	5	1	4	3	4	1	3			1	4	4	1	5	1			4	2	2	2	5	5	
	5	Mont Blanc	NORIKA	2	4	1	4	5	5	1	1			1	8	7	1	8	1			5	3	1	1	1	1	
BSA	III a	Montana	Böhm	2	7	2	5	3	3	1	5			4	3	3	2	4	1			3	3	2	2	5	5	
BSA	III a	Montis	Interseed	1	4	5	3	5	4	4	2			3	5	7	4	5	6	2	7	5	2	2	2	2	2	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt		Blütenstand							Knolle							
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufikeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
BSA	IV b	Moritz	Firbeck	2	5	1	4	4	6	2	5			1	4	4	1	5	1			1	5	2	2	3
EU	2	Morris	HZPC	3	6	3	4	5	6	1	1			3	4	4	1	5	1			3	3	2	2	3
BSA	III b	Mungo	Firbeck	2	6	1	5	3	5	1	1	6	4	1	5	3	1	4	1			3	4	2	2	1
EU	4	Musica	Meijer	3	6	1	3	6	4	1	5			1	1	4	1	5	1			4	3	2	2	5
EU	6	Nafida	Germicopa SAS	3	5	6	4	6	6	4	1			5	8	7	6	6	6	1	7	1	7	2	3	3
EU	1	Nandina	Böhm	3	5	3	4	5	4	1	2			5	4	4	2	6	4	1	5	2	4	2	2	4
	5	Nandu	Norka	1	5	1	3	8	5	1	4			1	4	5	1	5	1			2	5	2	2	3
EU	7	Napoleon	Coöperatie Agrico U.A.	2	4	4	3	5	6	3	1			5	8	7	4	8	1			2	5	2	2	4
BSA	II a	Natalia	SAKA	1	5	1	2	5	2	1	5			3	3	3	2	5	6	1	5	3	3	2	1	2
	7	Navigator	HZPC	1	3	5	4	6	6	3	1			5	7	5	2	4	4	5	1	6	4	3	2	3
EU	5	Nena	Danespo A/S	2	6	3	5	5	3	1	2			3	5	4	1	4	1			3	3	2	2	4
BSA	II a	Nevadina	Böhm	2	5	1	4	8	7	1	3			1	3	5	1	6	1			3	3	2	1	2
BSA	III a	Nicola	Saatzucht Sollau-Bergen	2	5	2		7	5	3	4	2	5	1	5	4	1	5				5	4	2	2	5
BSA	II a	Nixe	Norka	1	4	3	3	6	4	2	4			3	6	7	2	6	4	1	9	4	2	2	2	4

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattdiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe	
EU	4	Noblesse	HZPC	2	4	2	2	8	6	2	1			6	7	5	2	7	1				3	3	2	2	5
EU		Nofy	Coöperatie Agrico U.A.	2	4	4	3	5	7	4	1			1	6	7	1	6	1				2	4	2	4	
EU	7	Nomade	Maatschap	2	4	5		7	5	3	4	3	5	7	7	6	5	6	7				2	6	2	2	2
BSA	IV b	Nordlicht	Norika	1	4	4	4	6	5	3	4			6	9	7	5	5	7	2	8		2	5	2	4	3
EU	4	Norman	HZPC	3	5	3	4	5	5	3	2			6	7	7	3	6	5	2	7		2	5	2	2	4
EU	7	Novano	Niehoff	2	3	5	4	6	5	3	1			5	7	5	3	5	1								
EU	5	Odett	Lange	3	6	1	4	5	3	1	1			1	3	3	1	5	1				3	3	2	2	5
BSA	IV b	Odysseus	SAKA	2	5	2	2	8	6	3	3			6	6	7	3	7	1				2	4	2	2	4
BSA	III a	Olivia	Böhm	2	6	1	3	5	5	1	1			1	6	5	1	4	1				3	2	2	1	2
BSA	III a	Omega	Böhm	2	5	2		6	6	3	3	4	4	6	7	6	3	6	3				2	3	2	2	5
BSA	III b	Opal	SAKA	1	5	3	3	7	5	2	5	7	4	5	7	5	6	6	6	1	7		1	5	2	2	3
EU	5	Opera	HZPC	2	5	3	2	7	4	1	1			7	7	7	4	6	1				2	4	2	2	4
EU	5	Orwell	Pepsico	2	5	4	2	3	5	3	1			5	4	5	7	7	6	2	6		2	2	2	2	3
EU	5	Oscar	Plantera B.V.	2	4	2	2	8	6	1	1			5	5	5	1	5	5	1	7		2	3	2	2	4

BSA / EHS / EU				Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten		Sorte		Antragssteller laut BSA		Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand								Knolle				
BSA	EU	EU	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU	BSA	EU		
I a	2	5	5	Osira	Osiris	Otolia	Ottawa	Oxania	Palace	Papageno	Paroli	Partner	Pelikan	Penni	Petra	Piccolo Star	Picus	Böhm	Lange	Böhm	Böhm	Lange	Coöperatie Agrico U.A.	SAKA	Norika	NORIKA	NORIKA	NORIKA	Van Rijn	NORIKA	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
5	6	5	5	5	6	5	5	6	6	5	7	5	5	4	5	6	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	1	3	1	3	1	3	1	2	4	3	4	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
5	6	5	5	5	6	5	5	6	6	7	5	5	5	4	5	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	2	4	2	4	2	4	2	3	5	6	1	7	2	1	1	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1	1	3	2	3	2	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	2	3	1	3	2	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
IV/b																															
BSA																															

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattdornen	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe	
BSA	III a	Pirol	NORIKA	2	6	2	3	4	3	2	5			2	5	6	1	5	2	3	5	2	3	2	2	4	
EU	7	Plasent	Plas	2	5	3	3	6	5	2	1			4	6	5	3	6	6	1	7	2	2	2	4		
EU	6	Plasettie	Plas	2	4	7	3	8	5	1	1			4	7	6	3	5	1			2	5	2	3		
EU	8	Plasinka	Plas	3	6	1	7	6	7	5	5			4	5	4	5	1	5	3		4	5	4	5		
EU	6	Plasstärke	Plas	2	5	6	2	6	7	5	1			4	7	6	5	7	7	3	7	4	6	2	3		
EU		Platina	NORIKA		6	1		7	5	1		5	6	3	1							4		2	3		
BSA	III a	Pocahontas	SAKA	1	5	3	2	7	4	2	2			5	6	7	3	6	1			3	3	2	4		
BSA	III a	Polly	NORIKA	2	5	5	3	4	4	5	1			5	4	7	3	5	1			4	3	2	4		
EU		Poseidon	Interseed	1	3	5	2	6	6	2	1			6	8	7	6	6	6	1	7	4	3	2	4		
EU	2	Prada	Ijsselmeer polders BV	3	6	1	1	6	5	1	6			3	4	4	1	5	4	1	6	4	3	2	4		
EU	2	Premiere	Agrico	2	5	2		5	5	2	3	4	5	4	4	5	2	4				3	4	2	3		
		Presto	Böhm	3	5	2		8	4	2	2	3	5	5	2	4	2	4	4			2	3	2	4		
EU	3	Primavera	Kannegieter	2	4	5	2	5	5	4	3			5	5	5	3	6	1			4	4	2	3		
BSA	II b	Primus	NORIKA	2	5	1	2	7	4	1	2			3	5	5	2	7	5	1	7	3	2	2	2		

BSA / EHS / EU		Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand							Knolle						
					Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
EU			Princess	SAKA		5	1		6	5	2		6	5	1	5		1	4				3		2	2	5
BSA	II b		Priska	Böhm	2	4	2	2	5	4	1	5			3	4	4	4	5	4	1	7	2	4	2	2	4
	5		Privileg	Norka	3	5	3	4	5	4	2	1			1	7	6	1	7	2	3	5	4	4	2	2	4
EU	5		Punchy	Germicopa SAS	2	6	2	2	7	5	3	2			4	4	6	2	6	1			2	4	2	2	3
BSA	II a		Purple Pelisse	NORIKA	2	5	7	3	5	5	9	3			6	3	5	6	5	5	2	4	5	4	5	4	8
BSA	III a		Quarta	Böhm	1	4	1	3	5	5	1	5			3	7	5	2	5	1			3	4	2	3	4
BSA	II a		Queen Anne	SAKA	1	5	2	1	9	5	2	3			2	4	6	1	7	1			4	2	2	2	4
EU	6		Rainbow	S.A.R.L.	2	4	4	2	5	5	2	5			3	5	6	3	7	1			3	4	2	2	5
BSA	IV/b		Rambo	Firbeck	2	3	4	4	6	6	3	1			3	7	6	2	5	1			2	5	2	2	4
BSA	III a		Ramona	Böhm	1	5	6	3	5	3	6	1			5	4	5	5	4	8	1	9	3	3	3	2	4
EU	4		Ramos	Van Rijn	2	6	3		6	6	1	4	3	5	6	4	4	3	4				4	3	2	2	3
EU	2		Ranomi	Coöperatie Agrico U.A.	3	6	1	3	5	5	1	1			3	3	3	1	6	3	1	3	4	3	2	2	4
EU	5		Red Anna	VESA	2	5	5		4	5	4	3	4	5	2	6	4	3	4	2			2	3	3	3	5
BSA	III a		Red Emmalie	Ellenberg	2	5	6	3	6	5	7	2			5	6	5	3	5	1			5	3	3	3	6

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand									Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe	
BSA	IV a	Red Fantasy	Böhm	1	3	5	3	5	3	5	7	5	4	3	4	3	5	4	7	1	6	3	2	3	3	5	
EU	4	Red Lady	SAKA	2	5	4		9				5	5		1							4	5	3	4		
EU		Red Scarlett	HZPC	3	5	6		3	5	5	4	3	6	5	3	5		5	4			4	3	2	4		
EU	1	Red Sonia	Böhm	3	5	6	2	5	4	6	5			5	1	6	6	6	7	1	7	3	3	3	4		
EU	6	Regina	Böhm	3	4	1	4	4	5	1	1			1	5	5	1	5	1			3	3	2	5		
EHS		Reichskanzler	Gündel																								
BSA	III a	Ricarda	Böhm	1	5	7	2	6	4	9	4			5	5	6	8	4	6	1	8	3	5	3	2	1	
BSA	II a	Rikea	Lange	1	6	1	3	6	5	1	3	5	5	3	3	3	3	4	1			3	4	2	2	3	
BSA	III a	Rilana	Böhm	2	6	3	3	4	5	1	2			7	5	5	5	5	1			3	3	2	2	4	
BSA	I a	Rita	Bay. Pflanzenzucht es.	2	5	1	5	4	4	1	4	5	6	1	4	4	1	7	1			2	4	2	2	4	
		Roberta	Seatzucht Rudolf Pohl	1	4	1		7	5	3	3	6	4	4	9	7	2	7	4			2	4	2	2	3	
BSA	II a	Rodrigo	Uniplanta	2	4	3		5	6	3	2	5	5	6	6	6	7	5	7			3	3	3	3	3	
BSA	III a	Rosan	NORIKA	2	6	6	3	6	5	7	2			3	6	6	6	6	4	1	7	3	3	4	2	4	
BSA	I a	Rosara	SAKA	2	5	2	2	7	5	4	2			4	3	4	3	5	5	1	8	4	3	3	4	4	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand							Knolle						
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
EU	7	Royal	Landbrugets Kartoffelfond	3	5	2	3	5	6	2	1			3	1	3	2	4	2	1	3	3	5	2	2	4
EU	5	Rubin River	Royal Potato	3	5	3	3	6	6	5	1			4	4	4	2	6	8	1	8	3	3	5	3	3
EU	5	Rumba	Böhm	2	4	2	3	5	4	1	1			1	8	6	1	6	1			3	4	2	2	4
EU		Russet Burbank	EUROPLANT	2	5	5		1	5	3			7		3							3		2	2	1
EU	4	Sagitta	HZPC	2	5	2			6	1				2	7	5	3	6	5			3	3	1	1	4
BSA	I a	Salome	NORIKA	2	5	2		6	5	2	3	2	4	4	6	6	2	6				2	3	2	2	4
BSA	III a	Samoa	NORIKA	1	5	1	3	6	4	1	3			1	7	8	1	7	1			3	3	2	2	5
EU	6	San Francisco	Sloots	2	5	5	5	7	3	3	1			5	7	6	3	6	4	3	7	2	6	2	2	1
BSA	III a	Sandra	Bavaria-Saat	1	5	5	3	6	3	6	3			4	5	5	6	5	5	1	7	4	3	5	2	4
EU	1	Sanbel	Sloots	3	5	5	3	5	6	5	3			6	3	4	6	5	6	1	7	4	2	3	3	3
EU	3	Sanjava	Bavaria-Saat	2	4	1	3	6	4	1	1			3	5	5	2	4	3	1	5	3	3	2	2	3
EU	4	Santera	Stet Holland B. V.	2	4	1	2	5	6	1	1			3	3	3	1	5	1			4	2	2	2	5
BSA	II a	Santoria	EUROPLANT	2	5	2	3	4	3	1	1			2	4	3	2	4	1			3	3	2	2	5
BSA	III a	Saphia	Lange	2	4	3	3	6	5	1	1			2	5	6	2	5	1			4	3	2	2	3

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand								Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittellippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
EU	9	Saprodi	Semagri Holland	3	4	1	5	7	3	1	1			1	7	5	1	7	1			2	5	2	2	3
BSA	IV a	Saratoga Russet	Böhm	2	5	2	3	6	5	2	4			6	6	7	5	7	1			3	3	2	2	3
EU	8	Sarion	Semagri Holland	1	3	6	3	5	6	4	1			7	8	6	6	6	1			1	6	2	2	4
EU	9	Sarpo Mira	SARPO KFT	2	3	9	7		7					3	5	5	7	5				5	3	2	1	1
EU	4	Sassy	Germicopa SAS	2	4	4		5	6	1	3	3	6	6	6	6	3	6	6			1	5	2	2	3
	4	Satellite	Van Rijn	2	5	2		5	6	1	3	2	4	3	4	5	3	6				2	5	2	2	3
BSA	III a	Satina	SAKA	2	5	2		6	5	2	2	3	4	1	6	5	1	5				2	3	2	2	4
BSA	IV a	Saturna	Strahmann	2	5	4	4	4	6	3	3	5	6	7	7	6	5	6	1			2	5	2	2	3
EU	6	Sava	Landbrugets Kartoffelfond																							
EU	8	Scala	Sloots	2	3	3	4	7	6	1	1			3	5	5	3	5	1			1	7	2	2	3
EU	8	Scarlet	Semagri Holland	3	5	3	4	6	6	1	1			3	8	7	4	7	5	1	6	4	4	2	2	4
EHS		Schwarz Blaue Frankenwälder	Förderverein S.B. Frankenw.																							
BSA	III a	Selma	Bavaria-Saat	2	5	1	3	4	5	1	4	3	6	1	6	8	1	7	1			4	3	2	2	4
EU	8	Senata	Sloots	2	4	3	3	8	5	1	1			3	6	5	3	5	1			1	6	2	2	1

BSA / EHS / EU		Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt		Blütenstand							Knolle								
					Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufikeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe	
EU	5	Senna	Landbrugsels Kartoffelfond	2	4	6	4	5	5	5	3	1			3	7	6	5	6	5	1	7	3	4	4	3	3	4
BSA	II a	Serafina	Lange	2	7	1	3	5	5	5	1	3	6	6	3	2	2	2	3	3	1			4	4	2	2	3
EU	8	Sereno	Sloots	3	4	1	5	7	4	4	1	1			1	6	5	1	5	1				1	6	1	2	3
EU	7	Seresta	Sloots	1	4	5		5	6	6	3				5	6	6	5	6				1	7	2	2	3	
EU	9	Serum Star	Semagri Holland	2	3	3	2	6	8	8	3	1			6	6	5	3	6	4	2	6	1	5	2	2	1	
BSA	IV a	Sevim	Bavaria-Saat	1	3	2	2	7	4	4	2	3			3	6	7	7	3	6	3	1	6	2	4	2	4	
EU	4	SH C 1010	Stet Holland B. V.	2	6	1	4	7	6	6	1	1			6	7	7	2	6	5	1	7	2	4	2	2	4	
EU		Sieglinde	Böhm	2	6	1		5	5	5	2	3	4	5	6	4	4	3	5				4	4	2	2	3	
EU	8	Signum	Schilt	2	4	3		5	7	7	2	3	3	4	6	9	7	4	7	7			2	5	2	2	3	
BSA	III a	Simonetta	Böhm	1	4	4	4	3	4	4	2	4			4	5	5	4	5	1			4	3	2	2	5	
EU	9	Simphony	Sloots	1	3	3	2	5	7	7	1	1			3	8	7	2	7	1			2	5	2	2	2	
BSA	III b	Sinatra	SAKA	2	5	1	3	4	3	3	1	1			1	9	7	1	6	1			2	4	2	2	1	
EU	2	Sinora	Weuthen	2	5	4		6	6	6	2	5	3	4	7	5	5	4	5				2	5	2	2	3	
BSA	II a	Sissi	Bavaria-Saat	2	5	1	3	5	4	4	1	4	4	6	3	6	5	1	6	4	1	6	4	2	2	2	5	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand										Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe		
EU	9	Skawa	Niehoff	2	3	5	2	7	7	3	3	6	7	2	7	5	1	7	3	3	7	1	3	2	2	2	2	
EU	8	Skonto	Niehoff	2	7	1		5	3	1	1	3	7	2	7	5	1	6	3			3	7	2	2	4	4	
EU	7	Smaragd	Sloots	2	4	6		5	6	3	3	4	3	5	7	7	6	7				2	5	2	2	3	3	
BSA		Smilla	SAKA	2	5	2	2	7	3	3	2			3	2	3	3	4	4	1	7	3	3	2	2	4	4	
EU	9	Sofista	Sloots	2	5	3		7	4	2	3	4	4	3	5	4	3	4	4			3	6	2	2	2	2	
BSA	III a	Solara	Nordkartoffel	2	4	1	4	2	5	1	3	3	5	4	7	7	2	6	1			3	4	2	2	4	4	
	7	Solen	France	1	4	5	3	7	6	3	1			4	6	7	4	7	8	2	9	3	6	2	2	4	4	
BSA	I a	Solist	NORIKA	2	7	1	4	5	4	1	4			2	2	3	1	5	1			2	4	2	2	3	3	
EU	2	Solo	Bavaria-Saat	2	5	5	3	4	6	4	4			7	5	5	1	4	5	1	8	3	3	2	2	4	4	
BSA	III b	Sommergold	Firibeck	2	4	1	4	4	5	1	2	4	4	3	6	4	1	4	1			2	6	2	2	3	3	
BSA	III a	Soraya	NORIKA	2	6	3	2	7	5	1	3	5	6	3	4	4	2	5	1			3	3	2	2	4	4	
BSA	III b	Sorentina	Böhm	1	4	2	4	5	4	1	3			4	4	7	3	6	1			2	4	2	2	3	3	
EU	6	Spinela	VSUZ	2	4	7	3	6	7	7	2			2	5	4	4	4	2	1	2	3	2	3	3	5	5	
EU	9	Sprinter	Semagri Holland	2	4	4	2	6	8	3	1			5	8	7	3	7	7	1	8	1	5	2	2	3	3	

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand							Knolle						
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
EU	1	Spunta	Lange						7						3							5	3	2		3
BSA	III b	Stärkeprofi	Firbeck	1	4	2	3	6	6	1	3	4	4	2	7	6	1	4	1			2	6	2	2	1
EU	9	Stayer	SW Seed	2	4	2	2	6	6	1	1			1	7	7	1	6	1			1	6	2	2	3
BSA	I a	Stefanie	Lange	2	6	1	2	6	5	1	4	6	7	4	6	7	3	7	4	1	8	4	3	2	2	3
EU	8	Stratos	Sloots	2	4	4	4	6	6	1	1			4	7	6	4	7	1			2	7	2	2	2
EU	1	Sunita	HZPC	3	5	1	2	6	6	1	1			1	4	5	1	7	1			2	3	2	2	4
EU	1	Sunshine	SAKA	3	6	1	3	4	5	1	1			1	2	3	1	7	1			4	3	2	2	5
EU	9	Supporter	Semagri Holland	1	3	5	4	7	6	3	1			5	7	6	4	6	1			1	5	2	2	1
EU	2	Suzan	VESA	2	5	1	3	5	5	1	3			1	5	6	1	6	1	1	1	3	2	2	2	3
BSA	I a	Svea	NORIKA	2	6	2	3	4	4	1	3			3	3	3	2	7	1			2	4	2	2	5
BSA	III a	Swing	NORIKA	2	5	3	3	7	4	2	2			3	4	5	3	6	3	1	7	3	3	2	2	4
EU	7	Taisiya	Ijsselmeer polders BV	2	4	2	5	4	5	1	1			5	6	5	3	6	6	1	7	3	4	2	2	4
BSA	III a	Talent	NORIKA	2	4	2	3	5	4	1	2	7	5	1	6	5	1	6	1			4	2	2	2	5
EU	1	Talentine	HZPC	3	5	1	5	5	4	1	1			1	4	4	1	6	1			5	2	2	2	4

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand								Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattdornen	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augenrundes	Fleischfarbe
BSA	II b	Tamino	SAKA	2	6	4	3	5	5	3	5			5	5	4	3	5	5	3	8	2	4	2	2	3
BSA	III a	Taormina	Böhm	1	4	3	2	6	5	1	2			2	4	4	1	4	2	1	3	3	3	2	2	3
BSA	IV b	Tarzan	SAKA	2	5	1	3	7	6	2	2			3	5	6	1	5	1			2	4	2	2	3
EU	5	Taurus	HZPC	2	4	3	4	6	6	1	1			5	6	5	5	6	1			2	6	2	2	3
EU	8	Telma	Germicopa SAS	3	5	4	3	5	7	2	1			5	8	6	5	5	7	3	7	2	5	1	1	1
BSA	I b	Terrana	Norika	2	6	1	3	3	4	1	3			1	2	3	1	5	1			2	5	2	2	2
BSA	III a	Tessa	Norika	1	6	4	4	5	4	2	2			3	5	6	4	5	3	1	6	3	3	2	2	3
EU	1	Thalessa	Böhm	2	4	2	5	6	7	1	1			3	7	5	1	6	1			2	4	2	2	3
BSA		Theda	Böhm	1	4	3	1	7	5	1	2			5	5	7	4	6	1			4	2	2	4	4
BSA		Theda	Böhm	1	4	3	1	7	5	1	2			5	5	7	4	6	1			4	2	2	4	4
BSA	III a	Theresa	Böhm	1	4	1	4	5	5	1	3			1	4	4	1	4	1			3	3	2	2	4
EU	9	Thor	Landbrugets Kartoffelfond	2	4	4	3	6	6	3	1			2	7	5	1	5	1			2	4	2	2	2
EU	6	Tilbury	Germicopa SAS	1	5	2	2	7	5	2	3			4	5	6	4	6	6	1	7	1	5	2	2	2
		Toccata	Böhm	2	4	1		7	5	2	2	4	5	1	6	5	1	6	6			2	4	2	2	1

BSA / EHS / EU				Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten		Sorte		Antragssteller laut BSA		Pflanze			Blatt			Fiederblatt			Blütenstand								Knolle			
EU	7	Tokai	Danespo A/S	2	3	1	3	6	5	1	1			5	8	7	3	6	1			4	4	2	2	4				
BSA	III a	Tokio	Norika	1	6	1	2	6	4	1	4			1	2	3	1	3	1		2	4	2	2	3					
BSA	II b	Tomensa	Nordkartoffel	1	4	3	3	6	4	2	3			5	8	6	4	7	1		2	6	2	2	2					
BSA	III a	Torenia	Böhm	1	3	2	3	5	3	2	7			4	5	5	2	5	1		4	3	2	2	4					
EU	6	Tosca	Niederösterreich, SB	1	4	3		5	5	3	5	5	5	3	7	5	3	7			3	3	2	2	4					
BSA	III a	Toscana	SAKA	2	5	4	2	4	6	2	4	7	3	6	4	4	4	6	1		2	2	2	2	4					
EU		Trabant	Niederösterreich, SB	2	5	1	4	7	5	1	1			1	9	7	1	5	1	1	2	3	2	2	3					
		Transit	NORIKA	1	3	1	3	5	4	1	3	5	3	1	4	4	1	5	1		3	5	2	2	2					
BSA	III a	Travis	Interseed	1	3	3	3	7	5	1	2			1	5	6	1	7	1		5	3	2	2	3					
EU	5	Triple7	HZPC	2	4	1	2	8	4	1	1			3	8	6	1	5	1		2	5	2	2	3					
BSA	IV/b	Triton	NORIKA	1	5	1	4	5	5	1	5			4	7	5	2	5	5	1	2	5	2	2	3					
BSA	III a	Tuba	SAKA	2	5	4	2	7	5	2	3			4	6	6	3	6	1		3	3	2	2	3					
	3	Tucan	NORIKA	2	4	1		7	5	3	3	4	4	1	6	5	1	5			3	4	2	2	3					
EU	3	Twister	Coöperatie Agrico U.A.	2	3	2	4	6	4	2	3			4	5	5	1	6	5	2	6	2	2	2	4					

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand								Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blättledern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
EU	5	Ultra	Ijsselmeer polders BV	1	5	4	4		6	6	3			3	5	5	2	6				4	3	1	1	3
BSA	III a	Uta	Bavaria-Saat	1	4	3	3	6	3	1	2			4	5	6	2	6		3	1	7	3	2	2	4
EU	3	Valery	Böhm	3	5	6	3	4	6	6	3			5	4	4	6	5	7	1	8		4	3	3	5
EU		Valetta	SAKA	2	5	3		8	5	4	3	5	4	7	2	5	5	5	7			4	3	2	2	4
EU	6	Valfi	Bramborarsky	2	5	9		5	7	9	3	5	3	7	9	5	9	5	7			3	6	5	4	9
BSA	III b	Varuna	Böhm	2	5	1	3	5	5	1	3				1		1					2	5	2	2	2
BSA	II a	Venezia	Böhm	2	3	3	3	5	5	1	5	4	4	5	2	2	1	3	1				4	2	2	4
BSA	III b	Ventana	Böhm	1	6	4	4	6	7	2	4			3	7	6	3	5	1			1	6	2	4	3
EU	5	Ventura	SAKA	1	4	2		7	6	2	2	2	4	1	6	5	1	5				2	2	2	2	5
BSA	III b	Verdi	Uniplanta	2	4	3	2	8	4	2	3	5	5	3	7	6	2	7	4	2	7	1	5	2	2	2
EU	6	Vermont	Averis	2	4	3	2	6	6	3	1			5	7	6	3	5	1			1	6	2	2	3
EU	4	Victoria	HZPC	1	3	3		6	6	2	6	3	8	4	6	6	2	6				4	3	2	2	4
BSA	II a	Vindika	Böhm	2	5	4	3	6	5	2	1			5	6	6	5	5	5	1	6		4	2	2	5
BSA	I a	Vineta	Böhm	2	6	1	2	5	3	1	3	4	7	1	4	3	1	4	1			2	4	2	2	3

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt			Fiederblatt		Blütenstand										Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelrippe d. Oberseite	Häufikeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyan- färbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
BSA	IV a	Violetta	Ellenberg	2	5	7	3	7	5	9	3			2	4	3	2	5	5	3	7	5	3	5	4	8
EU	6	Virgil	Maatschap	3	5	1	4	6	6	1	1			1	3	2	1	3	1			5	3	2	2	4
BSA	IV a	Virginia	Böhm	1	4	3	2	5	5	3	4			5	7	6	3	5	1			3	3	2	1	2
EU	1	Vitabella	Van Rijn	3	6	5	2	6	7	1	2			4	4	4	3	5	6	1	7	3	4	2	2	4
BSA	II a	Vitus	NORIKA	2	6	1	3	3	4	1	3			1	1		1					4	3	2	2	1
BSA	II b	Vivat	Bavaria-Saat	1	5	2	3	6	3	1	2			3	4	4	3	5	3	1	6	3	4	2	2	3
	2	Viviana	Böhm	2	5	2	3	3	3	2	3			5	3	4	3	5	5	1	5	2	3	2	2	3
EHS		Vogtländische Blaue	Gündel																							
EU	5	VR 808	Van Rijn	3	6	3	3	6	4	3	1			7	7	7	3	7	5	3	5	2	4	2	2	4
BSA		Wanda	SAKA	1	5	5	3	7	4	7	2			5	4	6	7	6	5	1	7	3	4	6	3	3
BSA	II a	Wega	NORIKA	2	4	2	2	6	5	1	3	4	6	1	5	6	1	7	1			3	2	2	2	5
BSA	III a	Wendy	NORIKA	1	5	1	4	7	3	1	4			1	5	5	1	4	1			3	3	2	2	4
EU	7	Westamyl	VESA	2	5	1		6	4	1	3	9	5	1	6	5	1	5				2	4	2	2	4
	9	Wisent	Wildboer	2	4	2		6	6	2	3	2	5	3	8	7	3	6	8			2	7	2	2	3

BSA / EHS / EU	Reifegruppe / Reifezeitpunkt bei EU-Sorten	Sorte	Antragssteller laut BSA	Pflanze			Blatt				Fiederblatt			Blütenstand								Knolle				
				Laubstruktur	Wuchsform	Stängel Anthocyanfärbung	Offenheit	Vorhandensein von sek. Blattfiedern	Grünfärbung	Anthocyanfärbung an der Mittelnrippe d. Oberseite	Häufigkeit von Verwachsungen	Randwellung	Glanz der Oberseite	Anthocyanfärbung der Knospe	Blütenhäufigkeit	Größe des Blütenstands	Anthocyanfärbung am Blütenstiel	Größe der Krone	Intensität d. Anthocyanfärbung an d. Innenseite der Blütenkrone	Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite	Ausdehnung d. Anthocyanfärbung an der Innenseite	Form	Augentiefe	Schalenfarbe	Farbe des Augengrundes	Fleischfarbe
EU	9	Wotan	Landbrugets Kartoffelfond	3	4	6	4	7	7	5	1			6	7	5	6	5	6	1	7	1	5	3	3	2
EU	7	Xerxes	Niederösterreich SB	2	4	2	4	7	6	2	2			4	7	3	3	6	5	2	4	2	4	2	2	1
EU	9	Ydun	NSP Teterow	2	4	3	3	6	7	3	1			8	8	7	4	6	1			2	7	2	2	3
BSA	I a	Zorba	Stöver	2	4	1	2	7	7	1	4	7	7	1	6	6	1	5	1			5	3	2	2	3
EU	5	Zuzanna	EUROPLANT	2	7	1	3	7	6	1	3	5	6	1	5	5	1	7	1	1	1	2	5	2	2	3

BSA = Bundessortenamt, d. h. in Deutschland geprüfte und zugelassene Sorte
 EU = EU-Sorte, d. h. anerkennungsfähige Sorten nach § 55 Saatgutverkehrsgesetz
 EHS = Erhaltungssorte